LIBERO

FICHA TÉCNICA

- **CLASE**: FERTILIZANTE FOLIAR Y AL SUELO
- **INGREDIENTE ACTIVO**: AMINOACIDOS + MATERIA ORGANICA
- **ESTADO FISICO**: LIQUIDO
- **REGISTRO MAGA**: 130 – F – 4257 - 28
- **EMPRESA IMPORTADORA**: PROMOAGRO, S.A.
- **ORIGEN**: ESPAÑA
- **EXPORTADOR**: ZOBERBAC S.L.

LIBERO es un formulado de alta concentración para aplicación foliar y radicular; es de destacar la alta concentración de L-aminoácidos libres, con acción sobre la estimulación de la rizogénesis, la quelatación de cationes y precursores de fitohormonas.

LIBERO aporta macronutrientes asegurando un correcto suplemento para la nutrición y biestimulación de las plantas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. El producto no es fitotóxico si se aplica a la dosis recomendada.

AVISO DE GARANTÍA: La aplicación, manejo, transporte y almacenaje de éste producto están fuera de nuestro control, por lo que Zoberbac S.L. ni el importador o distribuidor local se hacen responsables del mal uso del mismo y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

FICHA TÉCNICA

USOS RECOMENDABLES:

CULTIVO	DOSIS	EPOCA Y FRECUENCIA
Tomate *(Solanum lycopersicum)* **Chile** *(Capsicum spp)* **Papa** *(Solanum tuberosum)* **Pepino** *(Cucumis sativus)* **Melón** *(Cucumis melo)* **Sandía** *(Citrullus vulgaris)* **Lechuga** *(Lactuca sativa)* **Coliflor** *(Brassica olerace)* **Repollo** *(Brassica olerácea)* **Cebolla** *(Allium cepa)*	Dosis foliar: 300-500 cc/hl. Dosis radicular: 15-20 L/ha.	Aplicación foliar, cada 1-2 semanas según el ciclo de cultivo. Aplicación radicular, 3-4 tratamientos después del trasplante.
Mango *(Mangifera indica)* **Cítricos** *(Citrus spp)* **Aguacate** *(Persea americana)* **Café** *(Coffea arabiga)* **Piña** *(Ananas comusus)* **Papaya** *(Carica papaya)* **Banano** *(Musa paradisiaca)* **Plátano** *(Musa balbisiana)*	Dosis foliar: 300-500 cc/hl. Dosis radicular: 18-25 L/ha. Dosis radicular: 90-120 L/ha.	Aplicación foliar y radicular en floración y desarrollo de frutos, realizar de 2 a 4 tratamientos. Aspersión de 2-3 cc a cada planta por semana.
Rosas *(Rosa montezumae)* **Clavel** *(Dianthus caryophyllus)* **Crisantemo** *(Chrysanthemum morifolium)* **Gerbera** *(Gerbera jamesonii)*	Dosis foliar: 300-500 cc/hl. Dosis radicular: 15-20 L/ha.	Aplicar foliarmente en los primeros estadíos. Al aplicar radicularmente, realizar de 3 a 4tratamientos, después del trasplante.
Arroz *(Oryza sativa)* **Sorgo** *(Sorghum bicolor)* **Maíz** (Zea mays) **Cebada** *(Hordeum vulgare)*	Dosis foliar: 300-500 cc/hl. Dosis radicular: 15-20 L/ha.	Aplicar foliarmente antes del ahijado o junto con los fitosanitarios.

AVISO DE GARANTÍA: La aplicación, manejo, transporte y almacenaje de éste producto están fuera de nuestro control, por lo que Zoberbac S.L. ni el importador o distribuidor local se hacen responsables del mal uso del mismo y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.