SPACHEM, S.L.
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

FICHA TÉCNICA

Nutri-Aktiv Fitoxi K-70

CARACTERISTICAS Y MODO DE ACCIÓN

Nutri-Aktiv Fitoxi K-70 fosfito potásico, 42-28 potenciador de las defensas naturales de las plantas.

Los fosfitos potásicos actúan como fungicidas sistémicos con buena actividad contra enfermedades causadas por hongos pertenecientes al orden Peronosporales, particularmente multitud de enfermedades de raíz y cuello de la planta causadas por Phytophtora spp. y mildius foliares como el de la vid, patata, tomate, y lechuga.

El **Nutri-Aktiv Fitoxi K-70** suministra Fósforo y Potasio a la planta, incrementando las autodefensas frente a enfermedades La presencia de Fósforo como ion fosfito le proporciona un razonable efecto profiláctico frente a posibles ataques de agentes infectantes que afectan a los frutos y a los troncos, fúngicas.



RIQUEZA GARANTIZADA

-FOSFITO POTÁSICO	**70.0% p/v**
EQUIVALENTE A:	
-FÓSFORO (P2O5)	**42.0 % p/v (30.0% p/p)**
-POTASIO (K2O)	**28.0 % p/v (20% p/p)**

Densidad: 1,40 gr./cc

SPACHEM, S.L.
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Nutri-Aktiv Fitoxi K- 70 está especialmente indicado en cultivos de Cítricos, Olivar y Hortícolas, café y caña de azúcar.

Nutri-Aktiv Fitoxi K-70 puede ser utilizado en todo el ciclo vegetativo y en especial durante los períodos de alto crecimiento.

MODO DE APLICACIÓN:

Puede utilizarse en aplicaciones aéreas (aviones, helicópteros, drones) y aplicaciones terrestres puede usarse en bomba de espalda manuales, bomba de mochila motorizadas, equipos de aspersión acopladas a tractor.

EPOCA DE EMPLEO

La aplicación de **Nutri-Aktiv Fitoxi K-70** interviene en los procesos fisiológicos esenciales para el desarrollo de la planta, floración, brotación, engorde y maduración.



Nutri-Aktiv Fitoxi K-70 puede aplicarse en pulverización foliar con suficiente agua para mojar bien la superficie de la planta que deseamos proteger o mediante fertirrigación a través del riego por goteo.

CULTIVO	DOSIS APLICACIÓN FOLIAR			
	Lt/Ha	l/mz	Nº Aplic	Momento de Aplicación
Arroz (*Oriza sativa*)	1-2	0.7-1.4	3 a 6	Después del trasplante y al inicio del macollamiento
Hortícolas de Hoja Lechuga	1-1,5	0.7-1.05	3 a 6	Desde inicio de la brotación, tratamiento al cuello cada 15 días
Frijo (*Phaseolus vulgaris*) Arveja (*Pisum sativum*)	1-1,5	0.7-1.05	3 a 6	Cuando la planta tenga 4 hojas verdaderas y a inicio de prefloración.
Cítricos	1-3	0.7-2.1	3 a 6	Con brotes en activo crecimiento, cada 15 días
Papa (*Solanum tubersum*)	1-2	0.7-1.4	3 a 6	15 días después del brotamiento. Antes del aporque cada 15 días
Tomate (*Lycopersicum esculentum*) Chile (*Capsicum annuum*)	1-2	0.7-1.4	3 a 6	15 días después del trasplante, tratamiento al cuello cada 15 días
Melón (*Cucumis melo*) Sandía (*Citrullus lanatus*)	1-2	0.7-1.4	3 a 6	Cuando la planta tenga 4 hojas verdaderas, a inicio de cuaje de fruto.
Cebolla (*Allium cepa*) Ajo (*Allium sativum*)	1-2	0.7-1.4	3 a 6	A los 8 días después del trasplante, al inicio de tuberización cada 15 días
Frutales de pepita	1-2	0.7-1.4	3 a 6	Con brotes en activo crecimiento, cada 15 días

SPACHEM, S.L.
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

CULTIVO	DOSIS APLICACIÓN FOLIAR			
	Lt/Ha	l/mz	Nº Aplic	Momento de Aplicación
Semilleros	0,5 - 1		1 a 2	Al trasplante, Mojado de raíces
Caña de Azúcar (*Saccharum officinarum*)	1-2	0.7-1.4	2 a 4	20 días después de la siembra o 15 días después del corte.
Café (*Coffea arabica*)	1-2	0.7-1.4	2 a 4	Como prevención de enfermedades y carencias. Comienzo floración y durante crecimiento de fruto.

Riego por Goteo

Riego por Goteo: 3 - 5 L/ha.

Se recomienda aplicarlo a final del riego.

COMPATIBILIDADES

Nutri-Aktiv Fitoxi K-70 es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos a excepción de azufres, aceites minerales, productos cúpricos y los de reacción fuertemente alcalina.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, irritación de garganta y/o de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular, etc…

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

Exposición dermal.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos.

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico; El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

SPACHEM, S.L.
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

GESTIÓN DE ENVASES:

Almacenar evitando exposiciones prolongadas a temperaturas extremas. Mantener almacenado entre 5º - 35ºC. Proteger de la luz directa y de la humedad.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión.

OBSERVACIONES:

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).

La Empresa garantiza la composición, formulación y contenido; el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.