FICHA TÉCNICA

STARKLE 20 SG

FABRICANTE: MITSU CHEMICALS AGRO, INC. 1-5-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7117, Japón.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Dinotefuran…… 20.0%
Ingredientes inertes…….. 80.0%
Total……100.0%

MODO DE ACCIÓN:

STARKLE 20 SG es un insecticida sistémico, con acción de contacto y estomacal. STARKLE 20 SG posee la más alta persistencia en el control, llegando con actividad hasta las 3 semanas después de aplicado. Ésta característica lo hace único para las aplicaciones tempranas, cuando las poblaciones de insectos objetivo son bajas, con el fin de proteger el cultivo para evitar pérdida de rendimiento.

STARKLE 20 SG es la única molécula del mercado con poder de volteo sobre adultos y ninfas.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Tomate *(Licopersicum esculentum)* **Chile** (Capsicum annum) **Papa** *(Solanum tuberosum)* **Berenjena** *(Solanum melongena)* **Tabaco** *(Nicotiana tabacum)*	**Mosca blanca** (*Bemicia tabaci*)	500 a 1,000 g/ha en 600 Litros de agua (350 – 700 g/mz en 420 Litros de agua. 0.8 – 1.6 g/L de agua (600 L de agua/ha)	Aplicar al aparecer los primeros insectos plaga. Realizar 3 aplicaciones por temporada, cada 7 -14 días. Aplicación en Drench 1.0 – 1.5 kg/ha, 3 días después de la emergencia del cultivo con suelo húmedo.
Calabaza *(Cucurbita máxima)* **Melón** *(Cucumis melo)* **Pepino** *(Cucumis sativus L.)* **Sandía** *(Citrullus vulgaris)* **Calabacín o Zucchini** *(Cucurbita pepo L)* **Güisquil** *(Sechium edule)*	**Mosca blanca** *(Bemicia tabaci)*	400 – 500 gramos por hectárea.	Aplicar al aparecer los primeros insectos plaga.

FICHA TÉCNICA

INTERVALO DE APLICACIÓN: Realizar tres aplicaciones de STARKLE 20 SG, con un intervalo de 7 a 14 días. Alternarlos con otros productos de diferente modo de acción como estrategia para el manejo de resistencia. No aplicar cuando haya presencia de abejas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: el período de carencia es de 1 día para plantas de la familia de solanáceas y cucurbitáceas. En cultivos de exportación, atender las exigencias del país de destino.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: se recomienda una espera de 24 horas después de la aspersión.

FITOTOXICIDAD: STARKLE 20 SG no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

COMPATIBILIDAD: STARKLE 20 SG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, antes de la aplicación con otros productos fitosanitarios o consulte a un especialista.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: transporte y almacene en su envase original, bien cerrado con su etiqueta debidamente pegada, separado de alimentos, medicina, ropa y utensilios de uso doméstico. Guárdelo bajo llave en un lugar fresco y ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces y de los animales.