SPACHEM
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

STELO

COMPOSICIÓN:

MATERIA ORGÁNICA	**40%p/p**
Nitrógeno total	3,7 % p/p
Nitrógeno orgánico	3,0 % p/p
K_2O	3,5 % p/p
Mn	0,1 % p/p
Zn	0,1 % p/p
Carbono (C) orgánico	26,3 % p/p
pH	6,5
Densidad	1,33

DESCRIPCIÓN

STELO es un concentrado líquido, de procedencia vegetal, con alto contenido en materia orgánica, que mejora el establecimiento del cultivo y el desarrollo temprano de la planta.
STELO tiene un elevado poder promotor de raíces y crecimiento vegetativo, así como una alta capacidad de complejar microelementos y, por lo tanto, mejorar su disponibilidad y absorción por parte del cultivo.

ORIGEN

La formulación y composición de **STELO** es exclusiva de Spachem elaborada tras un largo periodo de investigación y estudio de las necesidades del cultivo y el agricultor, ofreciendo una solución altamente efectiva a dosificaciones inferiores a las habituales que ofrecen resultados rápidos y visibles.

BENEFICIOS

- Aumenta la fertilidad y productividad del suelo.
- Aumenta la capacidad nutricional del suelo, mejorando su estructura y su actividad microbiana.
- Estimula el desarrollo radicular, mejora la retención de agua y en consecuencia aumenta el rendimiento del sistema raíz-suelo.
- Proporciona mejores rendimientos de cosecha y calidad.
- Aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico y la retención del agua en el suelo.
- Mejora la estructura del suelo y su aireación.
- Favorece la absorción de macronutrientes y micronutrientes.
- Actúa sobre formas no asimilables de fósforo.
- Mejora el sistema radicular de las plantas y la vida microbiana.

SPACHEM
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

➢ RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

STELO puede aplicarse en todo tipo de cultivos: **hortalizas, ornamentales, viveros, frutales, cítricos, olivo, vid, algodón, cereales, etc,** y mediante diversos sistemas tales como riego localizado, a manta, inyección…

Aplicación foliar

Potenciando la absorción de abonos foliares, a razón de 200-300 cc/hl, con la dosis de abono recomendadas.
- Épocas óptimas de aplicación: Inicio de la brotación o después del trasplante, primera etapa de crecimiento, en prefloración, cuajado y engorde y desarrollo de los frutos.

Aplicación al Suelo

CULTIVO	FERTIRRIGACION		OBSERVACIONES
	POR APLICACIÓN	TOTAL / CAMPAÑA	
Cítricos, frutales, olivo, almendro	10-15 L/Ha	80-100 L/ha	A partir del inicio de la brotación.
Hortícolas, patata	10 L/Ha	40-60 L/Ha	En los momentos más críticos de los cultivos. La primera aplicación se realizará con el objetivo de favorecer el enraizamiento, a los 10-15 días del trasplante y en caso de siembra directa, con plantas de 15 cm de altura.
Ornamentales y viveros	10 L/ha	50-80 L/Ha	Realizar aplicaciones cada 10 días.
Césped	15 L/Ha		Después de cada corte.
Viña y uva de mesa	10-15 L/Ha	80-100 L/ha	A partir del inicio de la brotación.
Extensivos e industriales	15-20 L/ha	50 l/ha	En riego por aspersión, inundación o surco.
Plantas perennes (tratamientos de inyección al suelo)	25-30 cc/pie		Plantas o arboles pequeños
	40-60 cc/pie		En árboles desarrollados disuelto en el agua. Realizar varias aplicaciones durante el año.

Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35ºC.

SPACHEM
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar entre 5º – 35ºC. Proteger de la luz directa y la humedad.

COMPATIBILIDAD:

STELO es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes excepto aquellos con pH alcalino. También es incompatible con nitrato cálcico. Se recomienda siempre hacer una prueba previa de compatibilidad

Nota: La aplicación recomendada puede variar según las características del suelo y las condiciones ambientales.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.